

# 플렌뷰 복용 안내문 및 주의사항

## 플렌뷰® 조제법



1  
2



- 1 플렌뷰® 1차복용제를 1L통에 전부 넣고, 차가운 물을 용기의 표시선까지(1000mL) 따릅니다.
- 2 플렌뷰® 산이 완전히 녹을 때까지 흔들어줍니다.
- 1 플렌뷰® 2차복용 A제와 2차복용 B제를 1L통에 전부 넣고 차가운 물을 용기의 표시선까지(1000mL) 따릅니다.
- 2 플렌뷰® 산이 완전히 녹을 때까지 흔들어줍니다.

※ 필요 시 이 용액을 마시기 전에 냉장할 수 있습니다. 조제된 용액은 냉장에서 보관하고 24시간 이내에 사용해야 합니다.

## 플렌뷰® 복용법

- 1 60분 동안 혼합용액을 목을 축이듯 **한모금씩 아주 천천히** 마십니다.

### 1차복용



약 복용

### [ 검사전날 ]

날짜: \_\_\_\_\_

시간: **오후 7시**

※ 물을 추가로 1L 더 마셔주십시오.

### 2차복용



약 복용

### [ 검사당일 ]

날짜: \_\_\_\_\_

시간: **오전 4시 30분**

※ 물을 추가로 1L 더 마셔주십시오.

- 2 2차 복용 후 동봉된 **가소콜 2개를 한꺼번에 드십시오!** 이후 가급적 금식해주세요!



※ 대장청결제 복용이 어려울 수 있으나, 장 청결 상태가 불량할 시 검사가 제대로 진행되지 못할 수도 있으므로 모두 복용하셔야 검사가 가능합니다!

## 검사 전 주의사항

고혈압, 심장병	검사 당일 기상 후 소량의 물과 약을 함께 드시고 오십시오.
당뇨병	인슐린, 혈당강하제를 복용중인 분은 검사 전 날부터 검사가 끝날 때까지 보류하십시오.
혈액순환제(아스피린)	검사 전 미리 복용 중지 할 필요 없으며, 검사 전 날 까지 복용하고 오십시오.
혈액응고억제제, 혈전용해제	처방의사와 상의 후 끊어도 된다고 할 경우 <b>검사 5일 전부터</b> 중지하십시오. 그 외 관련된 복용약도 처방의와 상의 후 약을 끊어 주시기 바랍니다.
만성변비	만성변비인 경우 미리 변비약 복용 후 플렌뷰를 복용하면 도움이 됩니다.

# 수면대장내시경 주의사항 안내

검진자명 :

검진일자 :

내원시간 : 시

분까지 **본관 2층 종합건강검진센터**

일

**검사 3일 전**  
주의해야 할 음식

씨 있는 과일이나 깨,  
버섯은 먹지 않습니다.



키위



딸기



수박



참외



포도



오렌지/귤



파



버섯류



깨

일

**검사 2일 전**  
주의해야 할 음식

콩류, 야채류, 해조류  
김치는 먹지 않습니다.

계란, 두부, 생선 등은  
드시도 됩니다.



잡곡/흑미밥



현미밥



콩나물



김치



깍두기



김



다시마



미역



양배추/샐러드



시금치



계란



닭고기



두부



생선



햄

일

**검사 전날**  
준비사항

검사 전날 오후 4시 이후에는  
가급적 식사를 하지 마십시오.



흰밥



흰죽



건더기 없는 국물



카스테라/케익



우유

아침, 점심시간만 가벼운 식사(흰죽+간장, 흰밥+국물, 카스테라 또는 케익+우유)를  
하시고 그 이후에는 저혈당 및 탈수 예방을 위해 물을 충분히 마시기 바랍니다.

**검사 전날 점심식사는 가볍게 드시고, 저녁은 금식 하십시오.**



에스엠지 연세병원  
SMG YEONSE HOSPITAL

문의

종합건강검진센터 055)240-7440, 7540